



Entre los análisis clínicos que se realizan en el laboratorio están:

- Biometría hemática
- Hemoglobina glucosilada
- Química sanguínea
- Perfil de lípidos
- Funcionales hepáticas
- Coagulación
- Prenupciales
- Adopción
- Perfil tiroideo
- Perfil TORCH
- Antígeno prostático
- Dengue
- Chagas
- Prueba de VIH
- Determinación de linfocitos CD4 /CD8
- Pruebas especiales

TRÍPTICO INFORMATIVO

INFORMES:

Laboratorio de Hematología
Centro de Investigaciones
Regionales. Dr. Hideyo Noguchi,
Unidad de Ciencias Biomédicas
Área de Apoyo al Diagnóstico
Clínico.

Edificio Inalámbrica,
Calle 43 No. 613 x 90
Col. Inalámbrica
C.P. 97069

Teléfono : 9 24 57 55
Ext 1230

Elaboró
: QFB. Gabriela Alonzo Salomón
M. en C. Irma Quintal Ortiz, QFB.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
M E X I C O



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

CENTRO DE INVESTIGACIONES REGIONALES
"DR. HIDEYO NOGUCHI"

LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA

¿Va usted a realizarse algún tipo de análisis clínico en el laboratorio de Hematología del Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi", Unidad de Ciencias Biomédicas?

Entonces debe cumplir las siguientes condiciones:

Horario de toma de muestras: 7:00 a 9:00 a.m. de lunes a viernes .

Los análisis clínicos en general requieren de un ayuno de 8 horas. Pero para las pruebas de perfil de lípidos, colesterol y triglicéridos es necesario tener ayuno de 12 horas.

FACTORES QUE PUEDEN ALTERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO:

EJERCICIO

Evitar hacer ejercicio el día de la toma ya que puede alterar los niveles de transaminasas, DHL, glucosa y creatinina.



FUMAR


Causa incremento en la glucosa, hormona de crecimiento, cortisol, colesterol, triglicéridos y urea, como resultado de la acción de la nicotina.

ALCOHOL

Evite el consumo de alcohol un día antes de la prueba ya que pueden alterarse las enzimas hepáticas, glucosa, colesterol, triglicéridos y DHL.

AYUNO PROLONGADO

El ayuno prolongado puede modificar los valores de glucosa y proteínas sanguíneas.



MEDICAMENTOS

Si toma algún medicamento favor de informarlo previo a la toma de sangre ya que algunos medicamentos interfieren en las pruebas como agregación plaquetaria y antidoping.

EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)

Debe recolectar la primera orina de la mañana, previo aseo con agua y jabón de la región genital y procurar la micción en el sanitario y recolectar el “chorro medio”.

ANTÍGENO PROSTÁTICO

No tener relaciones sexuales tres días antes de la prueba debido a que se alteran los resultado.